

ブドウ

- 1 ベと病・・・・・・・・・・・・・ 平年比やや多かった。
- 2 うどんこ病・・・・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった(平年並)。
- 3 灰色かび病・・・・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった(平年並)。
- 4 さび病・・・・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった(平年並)。
- 5 褐斑病・・・・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった(平年並)。
- 6 ハダニ類・・・・・・・・・・・・・ 平年比やや多かった。
- 7 チャノキイロアザミウマ・発生を認めなかった(平年並)。
- 8 その他の病害虫・・・・・・・・・・・・・ 一部のほ場のカメムシ類の吸汁害を確認した。

ブドウ巡回調査結果(100葉、50果穂調査)

調査日: 令和8年6月17日 (%)

調査結果	べと病			うどんこ病			灰色かび病		さび病		褐斑病		ハダニ類		チャノキイロアザミウマ	
	発病葉率	発病果穂率	ほ場率	発病葉率	発病果穂率	ほ場率	発病果穂率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	被害果穂率	ほ場率
京都市山科区 ①	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” ②	2.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町 ①	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” ②	2.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		1.0		0.0	
” ③	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
” ④	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
R 8年	0.7	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	16.7	0.0	0.0
平年比	やや多	並	やや多	並	並	並	並	並	並	並	並	並	やや多	やや多	並	並
	やや多			並			並		並		並		やや多		並	
平年	0.2	0.0	10.0	0.02	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	5.0	0.07	1.7
R 7年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 6年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 5年	1.2	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4年	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	16.7	0.0	0.0
R 3年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 2年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 元年	0.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 30年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H 29年	0.2	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	33.3	0.7	16.7
H 28年	0.8	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

発生程度別基準

(%)

	べと病		うどんこ病	灰色かび病	さび病	褐斑病	ハダニ類	チャノキイロアザミウマ
	発病葉率	発病花穂率	発病花穂率	発病花穂率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率	被害果穂率
無	0	0	0	0	0	0	0	0
少	1~10	1~10	1~5	1~10	1~10	1~10	1~10	1~10
中	11~30	11~30	6~15	11~30	11~30	11~30	11~20	11~30
多	31~50	31~50	16~30	31~50	31~70	31~70	21~40	31~50
甚	51以上	51以上	31以上	51以上	71以上	71以上	41以上	51以上