ダイコン

病害虫発生状況

1 黒斑細菌病 ・・・・・・・・・・ 平年比やや多かった。
2 白さび病 ・・・・・・・・・・・ 平年比やや多かった。
3 アブラムシ類 ・・・・・・・・・ 平年比やや少なかった。
4 コナガ ・・・・・・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年比やや少）。
5 ハスモンヨトウ ・・・・・・・・ 平年並であった。
6 ハイマダラノメイガ ・・・・・・ 平年並であった。
7 その他の病害虫 ・・・・・・・・ ハモグリバエ類の被害を木津川市①で認めた。

ダイコン調査結果（２５株調査：害虫個体数は１０株換算）

調査日：令和８年１１月１２、１３日

調査場所		黒斑細菌病	白さび病	アブラムシ類			コ ナ ガ		ハスモンヨトウ			ハイマダラノメイガ	
		発病株率（%）	発病株率（%）	有翅虫数（／10株）	無翅虫数（／10株）	寄生株率（%）	幼虫･蛹数（／10株）	寄生株率（%）	卵塊数（／10株）	幼虫数（／10株）	寄生株率（%）	幼虫数（／10株）	寄生株率（%）
木津川市 ①		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.40	4.0	0.0	0.0
〃 ②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
京丹後市弥栄町		24.0	8.0	0.0	0.4	4.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
京丹後市久美浜町		4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.4	4.0
平均	Ｒ８年	7.0	2.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.00	0.10	1.0	0.1	1.0
	平年比	やや多	やや多	やや少	並	やや少	やや少	やや少	並	並	並	並	並
	平年	8.2	2.6	0.3	7.6	7.6	0.7	3.9	0.01	0.13	0.9	0.1	1.4
	Ｒ７年	3.0	0.0	0.3	0.4	3.0	0.1	1.0	0.10	0.10	1.0	0.0	0.0
	Ｒ６年	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3	0.1	1.3	0.00	0.00	0.0	0.3	2.7
	Ｒ５年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.40	4.0	0.2	2.0
	Ｒ４年	2.7	0.0	0.3	0.0	2.7	0.1	1.3	0.00	0.00	0.0	0.3	2.7
	Ｒ３年	53.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
	Ｒ２年	2.7	0.0	1.5	46.3	19.3	1.3	3.3	0.00	0.13	1.3	0.0	0.0
	Ｒ元年	14.7	0.7	0.0	5.3	7.3	0.3	3.3	0.00	0.07	0.7	0.0	0.0
	Ｈ３０年	0.0	0.0	0.1	14.9	11.2	0.2	1.6	0.00	0.00	0.0	0.6	6.4
	Ｈ２９年	5.6	0.0	0.2	2.6	3.2	4.4	25.6	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
	Ｈ２８年	0.0	20.0	0.6	6.3	28.0	0.2	1.6	0.00	0.60	1.6	0.0	0.0
発生ほ場率（%）	Ｒ８年	50.0	25.0	25.0			0.0		25.0			25.0	
	平年比	やや多	やや多	やや少			やや少		並			並	
	平年	24.0	7.5	41.0			33.8		19.0			17.7	
	Ｒ７年	25.0	0.0	50.0			25.0		50.0			0.0	
	Ｒ６年	0.0	0.0	66.7			33.3		0.0			33.3	
	Ｒ５年	0.0	0.0	0.0			0.0		50.0			50.0	
	Ｒ４年	33.3	0.0	33.3			33.3		0.0			33.3	
	Ｒ３年	75.0	25.0	0.0			0.0		0.0			0.0	
	Ｒ２年	33.3	0.0	66.7			16.7		33.3			0.0	
	Ｒ元年	33.3	16.7	33.3			50.0		16.7			0.0	
	Ｈ３０年	0.0	0.0	60.0			40.0		0.0			60.0	
	Ｈ２９年	40.0	0.0	40.0			100.0		0.0			0.0	
	Ｈ２８年	0.0	33.3	60.0			40.0		40.0			0.0	