

水稲

病虫害の発生状況

- (1) 穂いもち
山城で平年並、南丹で例年並、中丹及び丹後では発生を認めていない（中丹：平年並、丹後：例年並）。府全体では、平年比やや少ない発生（表1）。
- (2) 紋枯病
山城及び中丹で平年比やや少なく、南丹及び丹後で例年並、府全体では平年比やや少ない発生（表2）。
- (3) 白葉枯病
発生を認めなかった（表5）。
- (4) トビイロウンカ
巡回調査で発生を認めなかった(平年並)(表3)。しかし、予察灯調査(亀岡)で誘殺を認めた。
- (5) コブノメイガ
山城で平年比やや多く、丹後で平年比多く、南丹及び中丹では発生を認めていない（南丹：例年並、中丹：平年並）。府全体では、平年比やや多い発生（表4）。
- (6) 斑点米カメムシ類
山城、中丹及び丹後で発生を認め、一部ほ場では多発した（表7）。
イネカメムシの予察灯（60W）への誘殺数は、京田辺市で平年比やや多く、亀岡市で平年比やや少なく、京丹後市で平年比多かった。
- (7) スクミリンゴガイ
山城及び南丹で発生を認めた（表6）。

発病・発生程度別基準

		無	少	中	多	甚
穂いもち	被害籾率	0	1-10	11-25	26-50	51以上
紋枯病	発病度	0	1-20	21-40	41-70	71以上
白葉枯病	発病度	0	1-5	6-20	21-50	51以上
トビイロウンカ	25株当たり虫数	0	1-125	126-500	501-1250	1251以上
ニカメイガ	被害株率(%)	0	1-30	31-60	61-90	91以上
コブノメイガ	被害葉率(%)	0	1-5	6-15	16-45	46以上
斑点米カメムシ類	すくい取り虫数	0	1-3	4-10	11-30	31以上

表 1 穂いもち調査結果（９月第３～４半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	被害 籾率	確認 ほ場率	発病 株率	被害 籾率	確認 ほ場率	発病 株率	被害 籾率	確認 ほ場率	発病 株率	被害 籾率	確認 ほ場率	発病 株率	被害 籾率
R 8	40.0	1.6	0.16	33.3	21.3	4.60	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	20.0	4.8	0.97
平年比 (例年比)	並	並	並	(やや少)	(並)	(やや多)	並	並	並	(並)	(並)	(並)	やや少	やや少	並
平年(例年)	42.7	3.9	0.25	(53.0)	(28.0)	(4.19)	35.0	7.5	0.48	(33.3)	(7.1)	(0.60)	39.0	10.2	1.22
R 7	80.0	12.0	0.88	60.0	7.2	0.36	33.3	1.3	0.07	50.0	14.0	0.70	60.0	8.5	0.52
R 6	60.0	3.2	0.16	66.7	16.0	1.27	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	26.7	6.4	0.46
R 5	40.0	2.4	0.12	50.0	26.0	6.50	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	26.7	7.7	1.77
R 4	40.0	3.2	0.16	66.7	41.3	2.80	66.7	17.3	1.80	100.0	12.0	0.80	58.3	17.0	1.28
R 3	33.3	2.7	0.20	100.0	90.7	21.87	50.0	4.0	0.20	100.0	4.0	0.20	58.3	25.0	5.62
R 2	16.7	0.7	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	50.0	34.0	3.70	15.4	5.5	0.57
R 1	16.7	0.7	0.17	—	—	—	0.0	0.0	0.00	—	—	—	14.3	0.6	0.14
H30	40.0	0.8	0.12	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	11.8	0.2	0.04
H29	20.0	1.6	0.08	100.0	44.0	3.20	100.0	42.7	2.27	0.0	0.0	0.00	54.5	18.7	1.10
H28	80.0	12.0	0.60	33.3	26.7	1.70	100.0	10.0	0.50	0.0	0.0	0.00	63.6	12.7	0.70

※詳細は表 5 参照。

表 2 紋枯病調査結果（９月第３～４半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	発病 株率	発病度	確認 ほ場率	発病 株率	発病度	確認 ほ場率	発病 株率	発病度	確認 ほ場率	発病 株率	発病度	確認 ほ場率	発病 株率	発病度
R 8	40.0	0.8	0.4	66.7	30.7	19.7	33.3	1.3	0.3	50.0	6.0	1.5	46.7	8.3	4.5
平年比 (例年比)	並	少	少	(並)	(並)	(やや多)	やや少	やや少	やや少	(並)	(並)	(並)	並	少	やや少
平年(例年)	49.0	21.7	8.0	(75.8)	(22.6)	(11.4)	70.7	20.8	7.7	(53.7)	(7.9)	(2.5)	58.7	21.0	8.7
R 7	40.0	11.2	4.8	80.0	26.4	13.6	100.0	17.3	9.0	50.0	2.0	0.5	66.7	16.3	8.0
R 6	20.0	2.4	0.2	66.7	13.3	3.3	100.0	16.0	4.0	0.0	0.0	0.0	40.0	6.8	1.5
R 5	40.0	6.4	2.0	50.0	36.0	31.5	40.0	4.8	1.4	0.0	0.0	0.0	40.0	13.3	9.5
R 4	40.0	36.0	12.6	66.7	21.3	3.7	33.3	2.7	0.7	100.0	4.0	1.0	50.0	21.3	7.3
R 3	33.3	29.3	8.2	66.7	42.7	24.3	100.0	30.0	9.0	100.0	24.0	6.0	58.3	32.3	12.2
R 2	50.0	28.7	8.2	100.0	38.0	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.5	19.1	6.3
R 1	66.7	44.0	19.0	—	—	—	100.0	80.0	27.0	—	—	—	71.4	49.1	20.1
H30	80.0	15.2	6.8	85.7	8.0	2.6	100.0	12.0	4.0	33.3	14.7	6.3	76.5	11.8	4.6
H29	60.0	20.0	7.4	100.0	8.0	4.0	33.3	29.3	16.3	100.0	22.0	6.0	72.7	20.7	8.8
H28	60.0	24.0	11.0	66.7	9.3	2.7	100.0	16.0	5.5	100.0	4.0	3.0	72.7	19.6	8.7

※詳細は表 5 参照。（ ）内は例年値。

表3 トビイロウンカ調査結果（9月第3～4半旬：本田25株見取り）

年度	山城				南丹				中丹				丹後				京都府			
	確認 ほ場率	長翅	短翅	幼虫	確認 ほ場率	長翅	短翅	幼虫	確認 ほ場率	長翅	短翅	幼虫	確認 ほ場率	長翅	短翅	幼虫	確認 ほ場率	長翅	短翅	幼虫
R 8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比 (例年比)	並	並	並	並	(並)	(並)	(並)	(並)	並	並	並	並	(並)	(並)	(並)	(並)	並	並	並	並
平年(例年)	13.3	1.2	0.9	0.6	(5.6)	(0.1)	(0.1)	(0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	8.2	0.6	0.4	0.3
R 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 2	100.0	12.0	8.8	6.2	50.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8	5.6	4.2	2.8
R 1	33.3	0.2	0.0	0.3	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	28.6	0.1	0.0	0.3
H30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

※虫数は、1ほ場当たりの平均値。詳細は表6参照。

表4 コブノメイガ調査結果（9月第3～4半旬：本田25株見取り調査）

年度	山城			南丹			中丹			丹後			京都府		
	確認 ほ場率	被害 株率	被害 葉率	確認 ほ場率	被害 株率	被害 葉率	確認 ほ場率	被害 株率	被害 葉率	確認 ほ場率	被害 株率	被害 葉率	確認 ほ場率	被害 株率	被害 葉率
R 8	40.0	4.0	0.20	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	75.0	13.0	0.70	33.3	4.8	0.25
平年比 (例年比)	やや多	やや多	やや多	(並)	(並)	(並)	並	並	並	(多)	(多)	(多)	やや多	やや多	やや多
平年(例年)	22.3	4.4	0.18	(18.5)	(10.3)	(0.59)	6.7	0.4	0.02	(5.6)	(0.2)	(0.01)	16.9	3.6	0.17
R 7	60.0	4.8	0.23	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	20.0	1.6	0.08
R 6	20.0	2.4	0.19	66.7	2.7	0.15	66.7	4.0	0.16	0.0	0.0	0.00	40.0	2.4	0.15
R 5	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
R 4	20.0	0.8	0.03	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	8.3	0.3	0.01
R 3	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
R 2	50.0	33.3	1.20	100.0	90.0	5.15	0.0	0.0	0.00	50.0	2.0	0.05	53.8	29.5	1.35
R 1	33.3	0.7	0.06	—	—	—	0.0	0.0	0.00	—	—	—	28.6	0.6	0.05
H30	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
H29	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00
H28	40.0	2.4	0.08	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	18.2	1.1	0.03

※上位2株調査。詳細は表6参照。

表5 水稻巡回調査結果 病害（9月第3～4半旬：25株見取り）

調査日：R8.9.11～16

地 点		穂いもち			紋枯病							白葉枯病		その他 病害等
		発病 株率	被害粗率	程度	発病 株率	発病程度				発病度	程度	発病 株率	発病 度	
						A	B	C	D					
京都市西京区														刈取済
京都市伏見区		0.0	0.0	無	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	番外：紋枯病
久御山町		0.0	0.0	無	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	
八幡市		0.0	0.0	無	4.0	0	0	1	0	2	少	0.0	0	
精華町		8.0	0.8	少	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	
木津川市		0.0	0.0	無	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	番外：穂いもち
山城平均	R8	1.6	0.16	少	0.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	少	0.0	0.0	調査ほ数:5
	R7	12.0	0.88	少	11.2	0.0	0.2	1.6	1.0	4.8	少	0.0	0.0	調査ほ数:5
亀岡市 1														刈取済
亀岡市 2														刈取済
京都市京北		64.0	13.8	中	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	
南丹市美山町														刈取済
南丹市園部町														刈取済
南丹市八木町		0.0	0.0	無	88.0	2	12	6	2	58	多	0.0	0	
京丹波町 1		0.0	0.0	無	4.0	0	0	0	1	1	少	0.0	0	
京丹波町 2														刈取済
京丹波町 3														刈取済
南丹平均	R8	21.3	4.60	少	30.7	0.7	4.0	2.0	1.0	19.7	少	0.0	0.0	調査ほ数:3
	R7	7.2	0.36	少	26.4	0.0	2.4	2.2	2.0	13.6	少	0.0	0.0	調査ほ数:5
綾部市														刈取済
福知山市長田														刈取済
福知山市半田														刈取済
福知山市夜久野町		0.0	0.0	無	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	
福知山市大江町		0.0	0.0	無	4.0	0	0	0	1	1	少	0.0	0	
舞鶴市		0.0	0.0	無	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	
中丹平均	R8	0.0	0.00	無	1.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	少	0.0	0.0	調査ほ数:3
	R7	1.3	0.07	少	17.3	0.0	1.3	2.0	1.0	9.0	少	0.0	0.0	調査ほ数:3
宮津市		0.0	0.0	無	20.0	0	0	0	5	5	少	0.0	0	
与謝野町		0.0	0.0	無	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	
伊根町														刈取済
京丹後市峰山町														刈取済
京丹後市大宮町		0.0	0.0	無	4.0	0	0	0	1	1	少	0.0	0	
京丹後市網野町														刈取済
京丹後市丹後町		0.0	0.0	無	0.0	0	0	0	0	0	無	0.0	0	
京丹後市弥栄町														刈取済
京丹後市久美浜町														刈取済
丹後平均	R8	0.0	0.00	無	6.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	少	0.0	0.0	調査ほ数:4
	R7	14.0	0.70	少	2.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	少	0.0	0.0	調査ほ数:2
府平均	R8	4.8	0.97	少	8.3	0.1	0.8	0.5	0.7	4.5	少	0.0	0.0	調査ほ数:15
	R7	8.5	0.52	少	16.3	0.0	1.1	1.7	1.3	8.0	少	0.0	0.0	調査ほ数:15

表6 水稲巡回調査結果 虫害①（9月第3～4半旬：25株見取り・払い落とし調査）

調査日：R8.9.11～16

地 点		トビイロウンカ						ニカメイガ			コブノメイガ			スミリンゴガイ			その他 害虫等
		寄生 株率	成虫		幼虫	合計 虫数	程度	被害 株率	程度	被害 茎率	被害 株率	被害 葉率	程度	調査 株外 被害	25株 卵塊 数	周辺 卵塊	
			長翅	短翅													
京都市西京区																	刈取済
京都市伏見区		0.0	0	0	0	0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無		0		
久御山町		0.0	0	0	0	0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無		0	○	
八幡市		0.0	0	0	0	0	無	0.0	無	0.0	16.0	0.79	少		0	○	
精華町		0.0	0	0	0	0	無	0.0	無	0.0	4.0	0.21	少	○	0		
木津川市		0.0	0	0	0	0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無		0		
山城平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	4.0	0.20	少	1/5	0.0	2/5	調査ほ数:5
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	4.8	0.23	少	0/5	0.6	5/5	調査ほ数:5
亀岡市 1																	刈取済
亀岡市 2																	刈取済
京都市京北		0.0	0	0	0	0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無		0		
南丹市美山町																	刈取済
南丹市園部町																	刈取済
南丹市八木町		0.0	0	0	0	0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無		0	○	
京丹波町 1		0.0	0	0	0	0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無		0		
京丹波町 2																	刈取済
京丹波町 3																	刈取済
南丹平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無	0/3	0.0	1/3	調査ほ数:3
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無	0/5	0.2	2/5	調査ほ数:5
綾部市																	刈取済
福知山市長田																	刈取済
福知山市半田																	刈取済
福知山市夜久野町		0.0	0	0	0	0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無		0		
福知山市大江町		0.0	0	0	0	0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無		0		
舞鶴市		0.0	0	0	0	0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無		0		
中丹平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無	0/3	0.0	0/3	調査ほ数:3
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無	0/3	0.0	0/3	調査ほ数:3
宮津市		0.0	0	0	0	0	無	0.0	無	0.0	28.0	1.11	少	○	0		
与謝野町		0.0	0	0	0	0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無		0		
伊根町																	刈取済
京丹後市峰山町																	刈取済
京丹後市大宮町		0.0	0	0	0	0	無	12.0	少	0.8	4.0	0.16	少		0		
京丹後市網野町																	刈取済
京丹後市丹後町		0.0	0	0	0	0	無	12.0	少	0.4	20.0	1.52	少	○	0		
京丹後市弥栄町																	刈取済
京丹後市久美浜町																	刈取済
丹後平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	6.0	少	0.3	13.0	0.70	少	2/4	0.0	0/4	調査ほ数:4
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	0.0	0.00	無	0/2	0.0	0/2	調査ほ数:2
府平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	1.6	少	0.1	4.8	0.25	少	3/15	0.0	7/15	調査ほ数:15
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	無	0.0	無	0.0	1.6	0.08	少	0/15	0.3	7/15	調査ほ数:15

注) コブノメイガは上位2葉調査。

表7 水稻巡回調査結果 虫害②（9月第3～4半旬：本田20回振りすくい取り調査）

調査日：R8.9.11～16

地 点		トビイロウンカ				斑点米カメムシ類			その他カメムシ類		コハネ 付け	サ サ キ	その他
		成虫		幼虫	計	種類	虫数	程度	種類	虫数			
		長翅	短翅										
京都市西京区													刈取済
京都市伏見区		0	0	0	0		0	無		0	0	0	ヒメトビウナカ2
久御山町		0	0	0	0		0	無		0	0	0	ヒメトビウナカ3
八幡市		0	0	0	0	アカシジ 2	2	少		0	0	2	セジ、ロウカ10、ヒメトビウナカ6、ツマク、ロコバ、イ17
精華町		0	0	0	0		0	無		0	0	0	ヒメトビウナカ5、ツマク、ロコバ、イ1
木津川市		0	0	0	0	イ1	1	少		0	0	4	ヒメトビウナカ2、ツマク、ロコバ、イ1
山城平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.6	少		0.0	0.0	1.2	調査ほ数:5
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0		0.2	少		0.0	0.2	0.0	調査ほ数:5
亀岡市 1													刈取済
亀岡市 2													刈取済
京都市京北		0	0	0	0		0	無		0	0	0	
南丹市美山町													刈取済
南丹市園部町													刈取済
南丹市八木町		0	0	0	0		0	無		0	0	0	
京丹波町 1		0	0	0	0		0	無		0	0	0	
京丹波町 2													刈取済
京丹波町 3													刈取済
南丹平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	無		0.0	0.0	0.0	調査ほ数:3
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0		1.4	少		0.0	0.0	0.2	調査ほ数:5
綾部市													刈取済
福知山市長田													刈取済
福知山市半田													刈取済
福知山市夜久野町		0	0	0	0	トグ、シラホシ2、ホソハリ3	5	中		0	3	1	ヒメトビウナカ16、セジ、ロウカ3、ツマク、ロコバ、イ1
福知山市大江町		0	0	0	0	イ30、クモヘリ10、ミナミアオ1、シラホシ2	43	甚		0	4	6	ヒメトビウナカ2、ツマク、ロコバ、イ2
舞鶴市		0	0	0	0		0	無		0	0	0	ツマク、ロコバ、イ1
中丹平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0		16.0	多		0.0	2.3	2.3	調査ほ数:3
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0		5.3	中		0.0	0.3	1.0	調査ほ数:3
宮津市		0	0	0	0	イ23、ミナミアオ18、クモヘリ3	44	甚		0	2	0	ツマク、ロコバ、イ1
与謝野町		0	0	0	0	イ9、クモヘリ2	11	中		0	0	0	イネミスズ、ウムシ1
伊根町													刈取済
京丹後市峰山町													刈取済
京丹後市大宮町		0	0	0	0	アカシジ 1、クモヘリ9、ホソハリ1、ヒョウタンカ 12	23	多		0	0	0	
京丹後市網野町													刈取済
京丹後市丹後町		0	0	0	0	イ10、クモヘリ10、アカシジ 3、ミナミアオ2	25	多		0	0	0	ヒメトビウナカ2
京丹後市弥栄町													刈取済
京丹後市久美浜町													刈取済
丹後平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0		25.8	多		0.0	0.5	0.0	調査ほ数:4
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0		10.5	中		0.0	0.0	0.0	調査ほ数:2
府平均	R8	0.0	0.0	0.0	0.0		10.3	中		0.0	0.6	0.9	調査ほ数:15
	R7	0.0	0.0	0.0	0.0		3.0	少		0.0	0.1	0.3	調査ほ数:15

(種名のカミシ、カミカミは略)

令和8年9月13日現在

予察灯（60W）へのトビイロウンカ初飛来日

年度	京田辺市	亀岡市	京丹後市
R 8	未飛来	8月30日	未飛来
R 7	9月23日	未飛来	9月10日
R 6	8月24日	9月25日	8月13日
R 5	9月20日	9月27日	9月21日
R 4	10月17日	未飛来	未飛来
R 3	未飛来	未飛来	8月26日
R 2	8月4日	8月6日	8月5日
R 1	8月8日	9月13日	8月21日
H30	未飛来	未飛来	8月29日
H29	未飛来	未飛来	未飛来
H28	未飛来	未飛来	未飛来
H27	未飛来	未飛来	未飛来
H26	9月1日	未飛来	7月14日
H25	8月20日	8月21日	8月21日
H24	未飛来	未飛来	9月10日
H23	9月10日	8月16日	未飛来
H22	9月13日	8月16日	9月11日
H21	8月20日	9月17日	8月21日
H20	未飛来	9月30日	8月23日
H19	10月10日	9月22日	8月30日
H18	7月16日	未飛来	9月5日
H17	9月13日	9月13日	7月12日
H16	未飛来	未飛来	7月30日
H15	8月28日	8月28日	8月28日
H14	未飛来	未飛来	未飛来
H13	未飛来	未飛来	未飛来
H12	未飛来	未飛来	未飛来
H11	9月25日	9月17日	7月11日
H10	7月3日	7月10日	6月28日
H 9	7月12日	8月21日	9月13日
H 8	9月5日	8月29日	未飛来
H 7	8月1日	8月18日	8月6日
H 6	未飛来	9月21日	9月6日
H 5	8月7日	8月1日	8月9日
H 4	7月27日	9月1日	7月11日
H 3	7月4日	6月26日	7月1日
H 2	6月23日	7月12日	7月16日

: 警報発表年
 : 注意報発表年（H10は多発年）
 : 防除所ニュースor技術情報発表年

イネカメムシ誘灯(60W)半旬別誘殺数

調査場所: 京田辺市

		8.3～9.2計										発生量: 平年比やや多	
月・半旬	R8	平年	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1、H31	H30	H29	H28	
4・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7・1	0	0.1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	1.1	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	1.8	5	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	3.1	10	19	0	1	0	1	0	0	0	0	0
6	1	3.9	10	37	0	0	0	1	0	0	0	0	0
8・1	0	1.4	2	9	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	0	0.2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	0	0.3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	3	0.6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.9	0	3	5	0	1	0	0	0	0	0	0
9・1	0	0.6	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3～9.2計	3	2.9	1	16	10	0	0	1	1	0	0	0	0
4～10月計	11	15.0	25	103	13	1	4	1	1	2	0	0	0


調査場所: 亀岡市(農林センター)

		8.3～9.2計										発生量: 平年比やや少	
月・半旬	R8	平年	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1、H31	H30	H29	H28	
4・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
7・1	0	1.5	1	11	2	0	2	0	0	0	0	0	0
2	0	4.9	12	17	7	10	3	0	0	0	0	0	0
3	6	2.8	11	1	14	1	0	0	0	0	0	0	1
4	12	13.9	38	33	29	7	30	0	2	0	0	0	0
5	9	12.8	18	49	30	7	17	0	7	0	0	0	0
6	10	7.6	22	22	15	2	7	0	6	0	2	0	0
8・1	13	13.6	23	38	16	20	12	6	11	6	4	0	0
2	8	17.2	14	27	15	38	11	28	14	12	4	9	0
3	0	10.3	6	13	23	23	10	14	6	6	2	0	0
4	6	4.2	4	11	4	14	4	2	3	3	0	0	0
5	2	6.9	6	19	7	8	22	6	0	3	0	0	0
6	1	5.5	5	5	14	6	9	6	2	5	3	0	0
9・1	0	2.3	4	2	1	5	1	10	2	0	0	0	0
2	0	0.7	0	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0
3	0	1.2	0	1	2	0	6	2	1	0	0	0	0
4	0	2.2	1	7	2	0	3	2	4	3	0	0	0
5	0	2.4	2	3	0	0	6	5	5	0	3	0	0
6	0	0.4	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0
10・1	0	0.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0.4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0.3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3～9.2計	9	29.9	25	45	56	43	56	37	14	16	7	0	0
4～10月計	67	111.6	169	245	198	132	157	82	64	37	21	11	0

調査場所: 京丹後市(丹後農業研究所)

調査場所:京丹後市(丹後農業研究所)		8.3～9.2計										発生量:平年比多	
月・半旬	R8	平年	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1、H31	H30	H29	H28	
4・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0.3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	4	0.6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1	1.1	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	7	0.2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	6	2.6	3	20	3	0	0	0	0	0	0	0	
8・1	3	1.0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0.3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
3	4	1.0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	15	4.3	6	33	3	1	0	0	0	0	0	0	
5	27	2.5	3	14	7	1	0	0	0	0	0	0	
6	7	3.2	5	16	10	0	1	0	0	0	0	0	
9・1	6	1.8	7	4	5	2	0	0	0	0	0	0	
2	0	1.2	7	2	1	2	0	0	0	0	0	0	
3	0	1.4	0	9	4	1	0	0	0	0	0	0	
4	0	0.4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0.2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0.2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
10・1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3～9.2計	58	14.0	30	77	26	6	1	0	0	0	0	0	
4～10月計	80	22.3	49	128	38	7	1	0	0	0	0	0	

イネカメムシ予察灯(60W)誘殺数
(京田辺市)



イネカメムシ予察灯(60W)誘殺数
(亀岡市)

