

カ ブ

病害虫発生状況

- | | | |
|---|---------|----------------------------|
| 1 | べと病 | 平年比多かった。 |
| 2 | 軟腐病 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 3 | 黒斑病 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 4 | 白斑病 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 5 | 白さび病 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 6 | アブラムシ類 | 発生を認めなかった（平年比やや少）。 |
| 7 | コナガ | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 8 | ハモグリバエ類 | 発生を認めなかった（平年並）。 |
| 9 | その他病害虫 | 峰山町の調査外株でシロイチモジヨトウの発生を認めた。 |

カブ調査結果（２５株調査：害虫個体数は１０株換算）

調査日：令和８年９月１４、１６日

調査場所		べと病	軟腐病	黒斑病	白斑病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハモグリバエ類
		発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	発病株率 (%)	有翅虫数 (／10株)	無翅虫数 (／10株)	寄生株率 (%)	幼虫・蛹数 (／10株)	寄生株率 (%)	被害株率 (%)
京都市右京区京北 ①		20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
京都市右京区京北 ②		4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
京丹後市峰山町		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
平 均	R 8 年	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
	平年比	多	並	並	並	並	やや少	並	やや少	並	並	並
	平年	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.15	10.04	3.4	0.13	1.3	0.5
	R 7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	80.80	12.0	0.00	0.0	0.0
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	16.53	4.0	0.80	8.0	0.0
	R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.13	1.3	0.00	0.0	1.3
	R 4 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.40	0.00	4.0	0.00	0.0	0.0
	R 3 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50	1.00	3.0	0.00	0.0	0.0
	R 2 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.27	2.7	0.0
	R 元年	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.10	1.30	6.0	0.20	2.0	0.0
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.00	1.3	0.00	0.0	0.0
	H 2 9 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.67	2.7	0.00	0.0	4.0
	H 2 8 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0
発 生 ほ場率 (%)	R 8 年	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0
	平年比	多	並	並	並	並	やや少			並		並
	平年	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	39.2			18.3		10.0
	R 7 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7			0.0		0.0
	R 6 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7			100.0		0.0
	R 5 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3			0.0		33.3
	R 4 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3			0.0		0.0
	R 3 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0			0.0		0.0
	R 2 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			33.3		0.0
	R 元年	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0			50.0		0.0
	H 3 0 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3			0.0		0.0
	H 2 9 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3			0.0		66.7
	H 2 8 年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0