カ　ブ

病害虫発生状況

1　べと病 ・・・・・・・・・・平年並であった。
2　軟腐病 ・・・・・・・・・・発生を認めなかった（平年並）。
3　黒斑病 ・・・・・・・・・・発生を認めなかった（平年並）。
4　白斑病 ・・・・・・・・・・発生を認めなかった（平年比やや少）。
5　白さび病 ・・・・・・・・・発生を認めなかった（平年並）。
6　アブラムシ類 ・・・・・・・発生を認めなかった（平年比少）。
7　コナガ ・・・・・・・・・・平年比やや多かった。
8　ハモグリバエ類 ・・・・・・平年比多かった。
9　その他病害虫 ・・・・・・・黒斑細菌病の発生を峰山町で、シロイチモジヨトウを峰山町と久美浜町で、オオタバコガを久美浜町で、カブラハバチを峰山町で認めた。

カブ調査結果（２５株調査：害虫個体数は１０株換算）　　調査日：令和８年１１月１２、１３日

調査場所		べと病	軟腐病	黒斑病	白斑病	白さび病	アブラムシ類			コナガ		ハモグリバエ類
		発病株率（%）	発病株率（%）	発病株率（%）	発病株率（%）	発病株率（%）	有翅虫数（／10株）	無翅虫数（／10株）	寄生株率（%）	幼虫･蛹数（／10株）	寄生株率（%）	被害株率（%）
亀岡市　①		52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	4.0
亀岡市　②		60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	8.0
京丹後市峰山町		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.4	4.0	16.0
京丹後市久美浜町		4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.8	8.0	32.0
平　均	Ｒ８年	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.3	3.0	15.0
	平年比	やや少	並	並	やや少	並	並	やや少	少	やや多	やや多	多
	平年	38.5	0.0	3.2	17.3	3.2	0.24	5.39	7.8	0.4	3.3	4.7
	Ｒ７年	48.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.10	6.90	7.0	0.0	0.0	3.0
	Ｒ６年	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.27	2.7	0.0	0.0	2.7
	Ｒ５年	33.3	0.0	0.0	6.7	0.0	0.00	8.00	10.7	0.1	1.3	1.3
	Ｒ４年	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.20	0.80	2.0	0.1	1.0	4.0
	Ｒ３年	0.0	0.0	22.0	1.0	3.0	0.10	0.00	1.0	0.2	1.0	1.0
	Ｒ２年	46.0	0.0	3.0	40.0	0.0	1.90	24.80	34.0	0.0	0.0	3.0
	Ｒ元年	45.3	0.0	6.7	36.0	29.3	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	5.3
	Ｈ３０年	64.0	0.0	0.0	34.7	0.0	0.13	0.00	1.3	0.0	0.0	4.0
	Ｈ２９年	50.0	0.0	0.0	44.0	0.0	0.00	0.20	1.0	2.5	17.0	13.0
	Ｈ２８年	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	12.90	18.0	1.5	13.0	10.0
発　生 ほ場率 （%）	Ｒ８年	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			50.0		100.0
	平年比	多	並	並	やや少	並	少			やや多		多
	平年	49.2	0.0	10.8	40.8	10.8	50.0			20.8		52.5
	Ｒ７年	50.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0			0.0		25.0
	Ｒ６年	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7			0.0		33.3
	Ｒ５年	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0	100.0			33.3		33.3
	Ｒ４年	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0			25.0		50.0
	Ｒ３年	0.0	0.0	50.0	25.0	50.0	25.0			25.0		25.0
	Ｒ２年	50.0	0.0	25.0	50.0	0.0	100.0			0.0		50.0
	Ｒ元年	66.7	0.0	33.3	100.0	33.3	0.0			0.0		66.7
	Ｈ３０年	66.7	0.0	0.0	66.7	0.0	33.3			0.0		66.7
	Ｈ２９年	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	25.0			75.0		75.0
	Ｈ２８年	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0			50.0		100.0