カキ

1　うどんこ病・・・・・・平年並であった。
2　炭疽病・・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
3　カキクダアザミウマ・・発生を認めなかった(平年並)。
4　カイガラムシ類・・・・発生を認めなかった(平年並)。
5　ハダニ類・・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
6　カメムシ類・・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
7　ハマキムシ類・・・・・発生を認めなかった(平年並)。
8　その他の病害虫・・・・発生を認めなかった。

発生程度別基準

病害虫名	調査項目	無	少	中	多	甚
うどんこ病、落葉病	発病葉率(%)	0	1～10	11～30	31～50	51以上
炭疽病	発病新梢(果)率(%)	0	1～2	3～5	6～10	11以上
チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ ハマキムシ類 カメムシ類 カキノヘタムシガ カイガラムシ類	被害葉(果)率(%)	0	1～2	3～5	6～10	11以上
ハダニ類	寄生葉率(%)	0	1～15	16～30	31～45	46以上

カキ巡回調査結果（１００葉、５０果、５０新梢調査）

調査日：令和８年６月１６日　　(%)

	うどんこ病		炭疽病		カキクダアザミウマ			カイガラムシ類		ハダニ類		カメムシ類		ハマキムシ類	
	発病葉率	ほ場率	発病新梢率	ほ場率	被害葉率	被害果率	ほ場率	寄生果率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率	寄生果率	ほ場率	寄生果率	ほ場率
京都市西京区　①	3.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃　②	7.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
〃　③	11.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
Ｒ８年	7.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年比	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	並		並		並			並		並		並		並	
平年	16.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｒ７年	0.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｒ６年	5.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｒ５年	5.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｒ４年	30.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｒ３年	28.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｒ２年	42.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｒ元年	26.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ３０年	4.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ２９年	7.3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ｈ２８年	17.7	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0