キュウリ（施設）

病害虫発生状況

1　べと病 ・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年比少）。
2　炭疽病 ・・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
3　うどんこ病 ・・・・・ 平年比やや少なかった。
4　斑点細菌病 ・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
5　褐斑病 ・・・・・・・ 平年比多かった。
6　モザイク病 ・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
7　灰色かび病 ・・・・・ 発生を認めなかった（例年並）。
8　アブラムシ類 ・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
9　ハダニ類 ・・・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
10　ハモグリバエ類 ・・・ 平年並であった。
11　アザミウマ類 ・・・・ 発生を認めなかった（平年並）。
12　コナジラミ類 ・・・・ 平年並であった。虫種はタバココナジラミ。
13　ハスモンヨトウ・・・・発生を認めなかった（平年並）。
14　ワタヘリクロノメイガ・発生を認めなかった（例年並）。
15　その他の病害虫・・・・各地で葉に退緑黄化症状を認めた。

発生程度別基準

	調査項目	無	少	中	多	甚
べ と 病	発病葉率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
炭 そ 病	発病葉率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
うどんこ病	発病葉率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
斑点細菌病	発病葉率(%)	0	1～25	26～50	51～75	76以上
モザイク病	発病株率(%)	0	1～20	21～40	41～70	71以上
アブラムシ類	1葉当たり寄生虫数	0	1～10	11～50	51～200	201以上

キュウリ巡回調査結果（２５株の２葉、４果調査）

調査日：令和８年１１月１３日

調査場所		べ と 病		炭 疽 病		うどんこ病		斑点細菌病		褐 斑 病		モザイク病	灰色かび病		アブラムシ類		ハダニ類		ハモグリバエ類		アザミウマ類		コナジラミ類		ハスモンヨトウ		ﾜﾀﾍﾘｸﾛﾉﾒｲｶﾞ
		発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病葉率(%)	発病株率(%)	発病株率(%)	発病株率(%)	発病果率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	被害葉率(%)	被害株率(%)	寄生虫数(/葉)	寄生葉率(%)	成虫数(/葉)	寄生葉率(%)	寄生株率(%)	被害株率(%)	寄生株率(%)
京都市伏見区		0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.08	6.0	0.0	0.0	0.0
久御山町		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	1.32	44.0	0.0	0.0	0.0
八幡市		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	22.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	4.0	0.00	0.0	3.08	60.0	0.0	0.0	0.0
平均	Ｒ８年	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0	0.0	0.0	10.0	38.7	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	1.3	0.00	0.0	1.49	36.7	0.0	0.0	0.0
	平年（例年）比	少	少	並	並	やや少	少	並	並	多	多	並	（並）	（並）	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並	（並）
	平年（例年）	20.1	38.2	2.4	2.4	29.0	54.3	1.1	2.1	0.3	1.3	0.1	(0.0)	(0.0)	0.07	0.5	0.10	2.5	0.6	3.3	0.33	3.8	1.17	31.8	0.0	0.0	(0.0)
	Ｒ７年	0.7	9.3	0.0	0.0	5.3	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	1.92	60.0	0.0	0.0	0.0
	Ｒ６年	12.0	30.0	0.0	0.0	2.7	16.7	10.7	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	4.0	0.00	0.0	2.99	59.3	0.0	0.0	0.0
	Ｒ５年	36.7	58.7	0.0	0.0	1.3	50.7	0.0	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.02	1.3	0.0	0.0	0.00	0.0	2.90	44.0	0.0	0.0	0.0
	Ｒ４年	12.0	37.3	0.0	0.0	28.0	40.0	0.0	1.3	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.24	1.3	0.08	1.3	0.0	0.0	0.00	0.0	1.85	33.3	0.0	0.0	0.0
	Ｒ３年	22.0	36.0	0.0	0.0	28.0	65.3	0.0	0.0	1.3	8.0	1.3	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	2.7	0.01	1.3	0.19	42.7	0.0	0.0	0.0
	Ｒ２年	50.7	85.3	24.0	30.7	62.7	98.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.77	21.3	0.0	0.0	0.0
	Ｒ元年	2.0	5.3	0.0	0.0	48.0	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.56	29.7	0.0	0.0	0.0
	Ｈ３０年	18.0	22.7	0.0	0.0	34.0	60.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.49	3.3	0.00	0.0	1.3	9.3	0.01	0.7	0.20	10.0	0.0	0.0	0.0
	Ｈ２９年	44.0	62.7	0.0	5.3	42.7	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.93	22.7	3.3	1.3	3.23	36.0	0.21	10.7	0.0	0.0	0.0
	Ｈ２８年	3.3	34.7	0.0	0.0	37.3	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—	0.00	0.0	0.00	0.0	1.3	16.0	0.00	0.0	0.07	6.7	0.0	0.0	—
発生ほ場率（%）	Ｒ８年	0.0		0.0		66.7		0.0		66.7		0.0	0.0		0.0		0.0		33.3		0.0		100.0		0.0		0.0
	平年（例年）比	少		並		並		並		多		並	（並）		並		並		並		並		並		並		（並）
	平年（例年）	73.3		10.0		86.7		6.7		13.3		10.0	(0.0)		3.3		13.3		33.3		16.7		90.0		0.0		(0.0)
	Ｒ７年	66.7		0.0		66.7		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0
	Ｒ６年	66.7		0.0		100.0		33.3		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		33.3		0.0		100.0		0.0		0.0
	Ｒ５年	100.0		0.0		66.7		33.3		33.3		0.0	0.0		0.0		33.3		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0
	Ｒ４年	66.7		0.0		100.0		0.0		33.3		33.3	0.0		0.0		0.0		33.3		33.3		100.0		0.0		0.0
	Ｒ３年	66.7		0.0		100.0		0.0		33.3		33.3	0.0		0.0		0.0		33.3		33.3		100.0		0.0		0.0
	Ｒ２年	100.0		33.3		100.0		0.0		0.0		33.3	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0
	Ｒ元年	66.7		0.0		66.7		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0
	Ｈ３０年	33.3		0.0		66.7		0.0		33.3		0.0	0.0		33.3		0.0		66.7		33.3		100.0		0.0		0.0
	Ｈ２９年	100.0		66.7		100.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		100.0		66.7		66.7		66.7		0.0		0.0
	Ｈ２８年	66.7		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0	—		0.0		0.0		100.0		0.0		33.3		0.0		—