ム ギ

病害虫等発生状況

二条大麦

１　赤かび病・・・・・発生を認めなかった（例年並）。

２　うどんこ病・・・・発生を認めなかった（例年並）。

３　その他の病害虫・・発生を認めなかった。

小麦

１　うどんこ病・・・・発生を認めなかった（例年並）。

２　黄斑症状・・・・・75%のほ場で発生を認めた（例年比やや少）。

３　その他の病害虫・・発生を認めなかった。

表1　二条大麦調査結果（調査日:令和7年4月15日）

		赤かび病		うどんこ病	
		発病穂率(%)	発病度	病斑面積率(%)	発病茎率(%)
亀岡市①		0.0	0.0	0.0	0.0
〃 ②		0.0	0.0	0.0	0.0
〃 ③		0.0	0.0	0.0	0.0
〃 ④		0.0	0.0	0.0	0.0
〃 ⑤		0.0	0.0	0.0	0.0
〃 ⑥		0.0	0.0	0.0	0.0
平均	R7年	0.0	0.0	0.0	0.0
	例年比	並	並	並	並
	平 均	0.0	0.0	0.1	6.0
	R6年	0.0	0.0	0.0	0.0
	R5年	0.0	0.0	0.0	0.0
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0
	R2年	0.0	0.0	0.8	48.0
	H31年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0
	H28年	−	−	−	−
	H27年	−	−	−	−
確認ほ場率(%)	R7年	0.0		0.0	
	例年比	並		並	
	平 均	0.0		8.3	
	R6年	0.0		0.0	
	R5年	0.0		0.0	
	R4年	0.0		0.0	
	R3年	0.0		0.0	
	R2年	0.0		66.7	
	R元年	0.0		0.0	
	H30年	0.0		0.0	
	H29年	0.0		0.0	
	H28年	−		−	
	H27年	−		−	

表2　小麦調査結果（調査日:令和7年4月15日）

		うどんこ病		黄斑症状	
		病斑面積率(%)	発病茎率(%)	斑点面積率(%)	被害茎率(%)
福知山市 ①		0.0	0.0	0.00	0.0
〃 ②		0.0	0.0	0.04	4.0
〃 ①		0.0	0.0	0.24	24.0
〃 ②		0.0	0.0	0.00	0.0
〃 ①		0.0	0.0	0.20	20.0
〃 ②		0.0	0.0	0.08	8.0
綾部市 ①		0.0	0.0	0.04	4.0
〃 ②		0.0	0.0	0.08	8.0
平均	R7年	0.0	0.0	0.09	8.5
	例年比	並	並	やや少	やや少
	平 均	0.0	0.0	2.53	49.4
	R6年	0.0	0.0	4.20	59.0
	R5年	0.0	0.0	0.89	79.0
	R4年	0.0	0.0	6.84	63.6
	R3年	0.0	0.0	0.71	45.6
	R2年	0.0	0.0	0.00	0.0
	H31年	0.0	0.0	−	−
	H30年	0.0	0.0	−	−
	H29年	0.0	0.0	−	−
	H28年	−	−	−	−
	H27年	−	−	−	−
確認ほ場率(%)	R7年	0.0		75.0	
	例年比	並		並	
	平 均	0.0		72.0	
	R6年	0.0		100.0	
	R5年	0.0		100.0	
	R4年	0.0		70.0	
	R3年	0.0		90.0	
	R2年	0.0		0.0	
	R元年	0.0		−	
	H30年	0.0		−	
	H29年	0.0		−	
	H28年	−		−	
	H27年	−		−	

（程度別基準）

	程　度	無	少	中	多	甚
赤かび病	発病穂率(%)	0	1～40	41～60	61～80	81以上
うどんこ病	病斑面積率(%)	0	1～4	5～8	9～16	17以上