

果樹の病害虫

ナシ

発生程度別基準

- 1 黒斑病・・・平年比やや多かった。
- 2 黒星病・・・平年比やや多かった。
- 3 赤星病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 4 うどんこ病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 ハダニ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 6 アブラムシ類・・・平年並であった。
- 7 ハマキムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 8 カメムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 9 シンクイムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 10 カイガラムシ類・・・発生を認めなかった。
- 11 その他の病害虫・・・ヨトウ類の卵塊を確認した。

| | 黒斑病 | 黒星病 | 赤星病 | うどんこ病 | ハダニ類 | アブラムシ類 | ハマキムシ類 | カメムシ類 シンクイムシ類 カイガラムシ類 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------------------------|
| | 発病葉率 | 発病葉率 | 発病葉率 | 発病葉率 | 寄生葉率 | 寄生新梢率 | 被害新梢率 | 被害果率 |
| 無 少 中 多 甚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1～5 | 1～5 | 1～5 | 1～5 | 1～15 | 1～5 | 1～2 | 1～2 |
| | 6～15 | 6～15 | 6～15 | 6～15 | 16～30 | 6～15 | 3～5 | 3～5 |
| | 16～30 | 16～30 | 16～30 | 16～30 | 31～45 | 16～30 | 6～10 | 6～10 |
| | 31以上 | 31以上 | 31以上 | 31以上 | 46以上 | 31以上 | 11以上 | 11以上 |

ナシ巡回調査結果(100葉、50果、50新梢調査)

調査日: 令和8年6月17日

(%)

| 調査結果 | 種類* | 黒斑病 | | 黒星病 | | 赤星病 | | うどんこ病 | | ハダニ類 | | アブラムシ類 | | ハマキムシ類 | | カメムシ類 | | シンクイムシ類 | | カイガラムシ類 | | |
|-----------|-----|------|-------|------|-------|------|------|-------|-----|------|------|--------|------|--------|-----|-------|------|---------|-----|---------|-----|-----|
| | | 発病葉率 | ほ場率 | 発病葉率 | ほ場率 | 発病葉率 | ほ場率 | 発病葉率 | ほ場率 | 寄生葉率 | ほ場率 | 寄生新梢率 | ほ場率 | 被害新梢率 | ほ場率 | 被害果率 | ほ場率 | 被害果率 | ほ場率 | 被害果率 | ほ場率 | |
| 京丹後市久美浜町① | 二十 | 1.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | | | |
| 〃 ② | 〃 | 20.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | | | |
| 京丹後市網野町 ① | 〃 | 11.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 2.0 | | 0.0 | | | | | | | | |
| 〃 ② | 〃 | 18.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | | | |
| 〃 ③ | 赤 | | | 3.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | | | |
| 京丹後市久美浜町③ | 〃 | | | 4.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | | | |
| 〃 ④ | 〃 | | | 4.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | |
| 八幡市 | 〃 | | | 3.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | |
| 京丹後市久美浜町⑤ | ゴ | 3.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | | | |
| 京丹後市久美浜町⑥ | 〃 | 6.0 | | | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | | | |
| R8年 | | 12.5 | 100.0 | 3.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平年比 | | 多 | 並 | 並 | 多 | 並 | やや少 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | 並 | - | - |
| | | やや多 | | やや多 | | 並 | | 並 | | 並 | | 並 | | 並 | | 並 | | 並 | | - | | |
| 平年 | | 4.5 | 76.0 | 3.8 | 43.5 | 0.6 | 20.5 | 0.01 | 0.9 | 0.4 | 10.1 | 4.3 | 24.7 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| R7年 | | 4.4 | 100.0 | 1.5 | 50.0 | 0.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| R6年 | | 2.6 | 80.0 | 0.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| R5年 | | 13.0 | 100.0 | 8.8 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| R4年 | | 4.5 | 100.0 | 5.4 | 40.0 | 1.4 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 10.0 | 0.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| R3年 | | 4.4 | 100.0 | 3.2 | 40.0 | 0.7 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| R2年 | | 3.0 | 60.0 | 9.8 | 100.0 | 0.2 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| R元年 | | 4.2 | 100.0 | 2.8 | 20.0 | 1.5 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| H30年 | | 4.6 | 80.0 | 4.0 | 40.0 | 1.7 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| H29年 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 63.6 | 13.5 | 72.7 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| H28年 | | 3.8 | 40.0 | 1.8 | 40.0 | 0.0 | 9.1 | 0.1 | 9.1 | 1.2 | 27.3 | 4.9 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |

*二十: 二十世紀、赤: 幸水、豊水等、ゴ: ゴールド二十世紀

*黒斑病の発病葉率及び発生ほ場率は二十世紀のみで算出し、ゴールド二十世紀は含めていない。