

果樹の病害虫

ナシ

- 1 黒斑病・・・平年比やや多かった。
- 2 黒星病・・・平年並であった。
- 3 赤星病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 4 うどんこ病・・・発生を認めなかった(平年比やや少)。
- 5 ハダニ類・・・平年並であった。
- 6 その他の病害虫・・・発生を認めなかった。

ナシ巡回調査結果（１００葉調査）調査日：令和８年９月１４日、１５日(%)

調査ほ場	種類*	黒斑病		黒星病		赤星病		うどんこ病		ハダニ類	
		発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	発病葉率	ほ場率	寄生葉率	ほ場率
京丹後市久美浜町①	二十	19.0				0.0		0.0		0.0	
〃 ②	〃	36.0				0.0		0.0		0.0	
京丹後市網野町 ①	〃	20.0				0.0		0.0		0.0	
〃 ②	〃	17.0				0.0		0.0		0.0	
〃 ③	赤			8.0		0.0		0.0		2.0	
京丹後市久美浜町③	〃			2.0		0.0		0.0		0.0	
〃 ④	〃			2.0		0.0		0.0		1.0	
八幡市	〃			0.0		0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町⑤	ゴ	17.0				0.0		0.0		0.0	
京丹後市久美浜町⑥	〃	8.0				0.0		0.0		0.0	
R 8 年		23.0	100.0	3.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	20.0
平 年 比		やや多	並	やや少	やや多	並	並	やや少	やや少	並	並
		やや多		並		並		やや少		並	
平 年		15.5	94.0	6.2	56.5	0.1	9.1	3.9	30.1	2.8	32.2
R 7 年		14.8	100.0	2.5	75.0	0.0	0.0	0.7	10.0	0.0	0.0
R 6 年		13.8	100.0	3.8	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	40.0
R 5 年		24.6	100.0	12.6	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
R 4 年		28.4	100.0	9.6	60.0	0.2	9.1	0.4	27.3	1.3	36.4
R 3 年		28.2	100.0	11.6	100.0	0.1	9.1	0.5	18.2	0.0	0.0
R 2 年		11.0	100.0	5.0	20.0	0.1	18.2	1.3	45.5	1.6	45.5
R 元年		5.4	100.0	3.4	40.0	0.3	18.2	3.7	45.5	9.3	72.7
H 3 0 年		7.8	60.0	1.8	60.0	0.4	27.3	9.5	45.5	0.0	0.0
H 2 9 年		13.2	100.0	7.4	40.0	0.0	0.0	11.3	54.5	7.9	54.5
H 2 8 年		7.8	80.0	4.8	60.0	0.1	9.1	12.0	54.5	5.8	72.7

*二十：二十世紀、赤：幸水、豊水等、ゴ：ゴールド二十世紀

*黒斑病の発病葉率及び発生ほ場率は二十世紀のみで算出し、ゴールド二十世紀は含めていない。

発生程度別基準(%)

	黒斑病	黒星病	赤星病	ハダニ類
	発病葉率	発病葉率	発病葉率	寄生葉率
無	0	0	0	0
少	1～5	1～5	1～5	1～15
中	6～15	6～15	6～15	16～30
多	16～30	16～30	16～30	31～45
甚	31以上	31以上	31以上	46以上