

トマト(施設)

病害虫の発生状況

- 1 疫病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 2 灰色かび病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 3 モザイク病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 4 葉かび病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 すすかび病・・・発生を認めなかった。
- 6 うどんこ病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 7 アブラムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 8 アザミウマ類・・・平年比やや多かった。虫種はミカンキイロアザミウマ。
- 9 コナジラミ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 10 ハモグリバエ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 11 ハスモンヨトウ・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 12 その他の病害虫・・・発生を認めなかった。

トマト巡回調査結果〔(25株・2複葉・2花・4果調査(単位:%、頭/葉)) 調査日:令和7年5月12日

調査場所		疫病	灰色かび病	モザイク病	葉かび病	すすかび病	うどんこ病	アブラムシ類	アザミウマ類	コナジラミ類		ハモグリバエ類		ハスモンヨトウ		
		発病 程度	発病 程度	発病 株率	発病 程度	発病 程度	発病 程度	寄生 株率	寄生 花率	白ぶくれ症 果率	寄生虫数 (/株)	寄生 葉率	被害 葉率	被害 株率	寄生 株率	被害 株率
京都市伏見区		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山町①		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山町②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山町③		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
亀岡市		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	1.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平均	R7年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平年(例年)比	並	並	並	並	—	並	並	多	並	並	並	並	並	並	並
	平年(例年)	0.0	0.04	0.0	2.0	—	0.9	0.4	1.9	1.5	0.00	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0
	R6年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R5年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	9.4	0.0	12.0	4.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	2.4	1.9	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.8	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.4	0.5	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	H29年	0.0	0.4	0.0	0.0	—	0.0	0.8	2.1	1.6	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	H28年	0.0	0.0	0.0	6.4	—	0.0	0.0	0.0	5.7	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	H27年	0.0	0.0	0.0	13.2	—	0.0	2.4	0.0	0.0	0.00	0.0	2.0	8.0	0.0	0.0
ほ場率	R7年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0		0.0		0.0		0.0	
	平年比	並	並	並	並	—	並	並	並	並	並	並	並	並	並	並
	平年	0.0	2.0	0.0	4.0	—	2.0	8.0	26.0		6.0		2.0		0.0	
	R6年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0		60.0		0.0		0.0	
	R5年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0		0.0		0.0		0.0	
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	20.0	0.0	60.0		0.0		0.0		0.0	
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	40.0		0.0		0.0		0.0	
	R2年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	20.0	0.0		0.0		0.0		0.0	
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	40.0		0.0		0.0		0.0	
	H29年	0.0	20.0	0.0	0.0	—	0.0	20.0	40.0		0.0		0.0		0.0	
	H28年	0.0	0.0	0.0	20.0	—	0.0	0.0	20.0		0.0		0.0		0.0	
	H27年	0.0	0.0	0.0	20.0	—	0.0	40.0	0.0		0.0		20.0		0.0	

(程度別基準)							
	程 度	無	少	中	多	甚	
疫病	発病度	0	1～25	26～50	51～75	76以上	
灰色かび病	発病度	0	1～20	21～40	41～70	71以上	
モザイク病	発病株率(%)	0	1～20	21～40	41～70	71以上	
葉かび病、すすかび病、うどんこ病	発病度	0	1～20	21～40	41～60	61以上	
アブラムシ類	寄生株率(%)	0	1～10	11～20	21～40	41以上	
コナジラミ類	寄生成虫数(頭/葉)	0	0.01～9	10～29	30～59	60以上	
	寄生葉率(%)	0	1～30	31～50	51～80	81以上	
ハスモンヨトウ	寄生株率(%)	0	1～10	11～20	21～40	41以上	
	被害株率(%)	0	1～10	11～20	21～40	41以上	
アザミウマ類	寄生花率(%)	0	1～10	11～20	21～40	41以上	
	白ぶくれ症果率(%)	0	1～5	6～15	16～30	31以上	