

野菜

トマト(施設)

病害虫の発生状況

- 1 疫病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 2 灰色かび病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 3 モザイク病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 4 葉かび病・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 5 すずかび病・・・発生を認めなかった。
- 6 うどんこ病・・・平年並であった。
- 7 アブラムシ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 8 アザミウマ類・・・花での発生は例年並、白ぶくれ果は平年比やや多い発生であった。虫種は主にミカンキロアザミウ
- 9 コナジラミ類・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 10 ハモグリバエ類・・・平年並であった。
- 11 ハスモンヨトウ・・・発生を認めなかった(平年並)。
- 12 その他の病害虫・・・カンザワハダニの発生を久御山町②で認め、黄化葉巻病の発生を久御山町③で認めた。

トマト巡回調査結果〔(25株・2複葉・2花・4果調査(単位: %、頭/葉)) 調査日: 令和7年6月13、16日

		疫病	灰色かび病	モザイク病	葉かび病	すすかび病	うどんこ病	アブラムシ類	アザミウマ類		コナジラミ類		ハモグリバエ類		ハスモンヨトウ	
		発病 程度	発病 程度	発病 株率	発病 程度	発病 程度	発病 程度	寄生 株率	寄生 花率	白ぶくれ症 果率	寄生虫 数(ノ株)	寄生 葉率	被害 葉率	被害 株率	寄生 株率	被害 株率
京都市伏見区		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山町①		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
久御山町②		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	6.0	0.000	0.00	6.0	36.0	0.0	0.0
久御山町③		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	18.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
亀岡市		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	21.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
平均	R7年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	9.5	9.6	0.000	0.00	1.2	7.2	0.0	0.0
	平年(例年)比	並	並	並	並	－	やや多	並	(並)	やや多	並	並	並	並	並	並
	平年(例年)	0.0	0.0	0.0	3.0	－	6.5	0.1	(9.2)	3.9	0.037	1.24	3.0	7.0	0.0	0.0
	R6年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	9.7	2.5	0.360	12.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	R5年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.8	7.4	0.0	0.000	0.00	1.2	6.4	0.0	0.0
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	－	18.6	0.0	10.5	12.4	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0	－	7.8	0.0	11.7	5.6	0.008	0.40	0.0	0.0	0.0	0.0
	R2年	0.0	0.0	0.0	1.0	－	0.0	0.0	6.5	3.0	0.000	0.00	0.4	0.8	0.0	0.0
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	－	3.0	0.0	24.6	3.6	0.000	0.00	0.5	3.0	0.0	0.0
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	－	3.6	0.0	10.3	1.0	0.000	0.00	0.0	2.0	0.0	0.0
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	－	6.6	0.0	1.0	1.6	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
	H28年	0.0	0.0	0.0	10.2	－	10.6	0.0	0.8	8.0	0.000	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
H27年	0.0	0.0	0.0	19.0	－	7.0	0.0	－	1.2	0.000	0.00	28.0	57.6	0.0	0.0	
ほ場率	R7年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	80.0		0.0		20.0		0.0	
	平年比	並	並	並	並	－	やや少	並	やや多		並		並		並	
	平年	0.0	4.0	2.0	10.0	－	38.0	2.0	61.0		10.0		16.0		0.0	
	R6年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	50.0		80.0		0.0		0.0	
	R5年	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	20.0	60.0		0.0		20.0		0.0	
	R4年	0.0	0.0	0.0	0.0	－	60.0	0.0	60.0		0.0		0.0		0.0	
	R3年	0.0	0.0	0.0	0.0	－	20.0	0.0	40.0		20.0		0.0		0.0	
	R2年	0.0	0.0	0.0	40.0	－	20.0	0.0	100.0		0.0		20.0		0.0	
	R元年	0.0	0.0	0.0	0.0	－	20.0	0.0	100.0		0.0		20.0		0.0	
	H30年	0.0	0.0	0.0	0.0	－	40.0	0.0	60.0		0.0		20.0		0.0	
	H29年	0.0	0.0	0.0	0.0	－	40.0	0.0	40.0		0.0		0.0		0.0	
	H28年	0.0	40.0	20.0	40.0	－	40.0	0.0	80.0		0.0		0.0		0.0	
	H27年	0.0	0.0	0.0	20.0	－	40.0	0.0	20.0		0.0		80.0		0.0	

(程度別基準)		程 度	無	少	中	多	甚
疫病		発病度	0	1～25	26～50	51～75	76以上
灰色かび病		発病度	0	1～20	21～40	41～70	71以上
モザイク病		発病株率(%)	0	1～20	21～40	41～70	71以上
葉かび病、すずかび病、うどんこ病		発病度	0	1～20	21～40	41～60	61以上
アブラムシ類		寄生株率(%)	0	1～10	11～20	21～40	41以上
コナジラミ類	寄生成虫数(頭/葉)	0	0.01～9	10～29	30～59	60以上	
	寄生葉率(%)	0	1～30	31～50	51～80	81以上	
ハスモンヨトウ	寄生株率(%)	0	1～10	11～20	21～40	41以上	
	被害株率(%)	0	1～10	11～20	21～40	41以上	
アザミウマ類	寄生花率(%)	0	1～10	11～20	21～40	41以上	
	白ぶくれ症果率(%)	0	1～5	6～15	16～30	31以上	