

麻しん（はしか）患者の発生について

- 令和7年4月21日（月）、京都府内の医療機関から麻しん患者の届出があり、検査を実施したところ、麻しんと確定しました。
- 当該患者の行動調査を進めた結果、感染可能期間に不特定多数の方に接触している可能性が高いことが判明したため、広く注意喚起をお願いします。

1 患者の概要

- (1) 年齢・性別 20代・女性
- (2) 渡航歴 あり
- (3) 経過 4月17日（木） 発熱出現
4月18日（金） 発疹出現、医療機関受診
4月19日（土） 咳出現、医療機関受診
4月21日（月） 医療機関受診
府保健環境研究所の検査で麻しん確定
- (4) ワクチン歴 2回

2 感染可能期間（4月16日（水）以降）に利用された施設

日付	滞在時間	施設等
4月16日 （水） 16時ごろ	7:08～7:48	近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘駅～Osaka Metro 中央線 本町駅
	7:51～7:56	Osaka Metro 御堂筋線 本町駅～梅田駅
	8:08～8:38	阪急京都線・千里線 大阪梅田駅～北千里駅
	15:16～15:46	阪急千里線・京都線 北千里駅～大阪梅田駅 天神橋筋六丁目駅
	15:49～15:53	Osaka Metro 谷町線 天神橋筋六丁目駅～東梅田駅
	16:00～16:05	Osaka Metro 御堂筋線 梅田駅～本町駅
	16:11～16:53	Osaka Metro 中央線 本町駅～近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘駅
4月17日 （木）	7:08～7:48	近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘駅～Osaka Metro 中央線 本町駅
	7:51～7:56	Osaka Metro 御堂筋線 本町駅～梅田駅
	8:08～8:38	阪急京都線・千里線 大阪梅田駅～北千里駅
	21:33～21:46	阪急千里線・京都線 下新庄駅～大阪梅田駅
	22:01～22:06	Osaka Metro 御堂筋線 梅田駅～本町駅
	22:11～22:52	Osaka Metro 中央線 本町駅～近鉄けいはんな線 学研奈良登美ヶ丘駅

※鉄道会社及び施設への直接の問い合わせはお控えください。

3 府民の皆様へ

麻しん（はしか）の潜伏期間は約10日（最大21日間）のため、最終接触後3週間（21日間）の間に症状（高熱・発疹・咳・鼻水・目の充血等）が現れた場合は、必ず事前に医療機関へ電話で連絡し、麻しん（はしか）の疑いがあることを伝え、医療機関の指示に従って受診してください。

なお、受診の際は公共交通機関の利用を控えてください。

4 報道機関の皆様へ

感染症法の趣旨に則り、個人情報保護の観点から患者やその家族・関係者等が特定されないよう、特段の御配慮をお願いいたします。

（次頁あり）

訂正 当該患者が利用された施設の一部に誤りがありましたので、訂正します。(4月25日)

【参考】京都府内における麻しんのこれまでの報告

令和2年～5年	令和6年	令和7年
0件	4件	4件 (今回含む)

【麻しん（はしか）について】

1 麻疹とは

麻しんは、空気感染、飛沫感染、接触感染により感染します。感染性が非常に高く、今まで麻しんに罹患したことのない人や麻しんのワクチンを接種したことのない人が麻しんウイルスに暴露されると、ほぼ100%感染すると言われています。感染すると、約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。その後、一旦熱は下がるが、再び高熱が出て顔・首・全身に発しんが現れ4～5日間続きます。症状は、7～10日で回復します。感染力のある期間は、発症の1日前から、解熱後の3日後までとされています。

2 注意喚起

麻しんは感染力が強いため、手洗い、マスクでは予防できません。麻しんを予防するためには、MRワクチン（麻しん風しん混合ワクチン）の接種が最も有効です。定期予防接種を未接種の方は早急に接種をご検討ください。

麻しんを疑う症状がある場合は、事前に医療機関に電話で麻しんの疑いがあることを伝え、早めに医療機関を受診してください。

(参考) 麻しん・風しん(MR) 予防接種定期接種対象者

第1期…生後12月から24月に至るまでの間にある人

第2期…小学校就学前の1年にある人※(いわゆる幼稚園等の年長に相当する人)

※令和7年度：平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれの方

本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先 075-414-4723